

Les naissances au GAEC des Rondeaux

NEWSLETTER 15 | FÉVRIER 2021

UNE EXPLOITATION LAITIÈRE

C'est la première fois que je me rends sur une exploitation laitière: c'est à dire que tout le lait produit est vendu à une laiterie, en l'occurrence à Triballat. Le GAEC des Rondeaux possède 96 hectares de cultures: de la prairie pour l'autonomie alimentaire des chèvres, ainsi que des céréales: du blé et du triticale (céréales- graminées). Le blé est vendu en coopérative et le triticale est donné aux chèvres. Le troupeau est composé de 390 chèvres alpines et de 18 boucs. L'exploitation est gérée par 2 frères très accueillants: Thierry et Eric. Le lait est vendu à la laiterie en AOP Chavignol puisque le GAEC est dans la zone AOP Crottin de Chavignol.

La semaine dernière je me rends donc aux Rondeaux pour les mises bas. Avec près de 400 chèvres, j'ai vu le déroulement de belles naissances mais aussi de moins bonnes.

PREMIER JOUR, VACCINÉE !

Lundi matin, je vois mon premier spécimen: un chevreau à 6 pattes ! En 5 minutes, j'apprends donc que le véto arrive pour euthanasier ce petit, ainsi que 3 autres chèvres sur six au total qui ne se lèvent plus depuis 3 semaines ! En effet, souvent, elles portent 2 ou 3 chevreaux, voire 4, et leurs mamelles sont si grosses que le poids cumulé n'est plus supportable. Bien que Thierry les lève une fois par jour, elles sont souvent allongées sur le même coté et leurs pattes restent ankylosées. Le véto arrive: 2 chèvres sur 3 sont piquées, on laisse une chance à l'une d'entre elles. Il n'y a désormais plus que 4 malades sur 6. (Une se relèvera quelques jours plus tard et retournera même à la traite !)

Je ne vous cache que **les larmes montent** rapidement, surtout quand l'une des chèvre a du mal à partir ... **quand "le départ" se fait en 10 secondes, "ça va". 1 minute c'est long, trop long...** Je suis rassurée, Eric a aussi la larme facile.



Les 3 malades toujours vivantes

Le live en 4 minutes !

Assistez à une naissance et aux mignonerics avec les biberons et les chevreaux.



Heureusement, on est rapidement rattrapé par la vie. Voilà une chèvre qui met bas ! 2 chevreaux plus tard, on est déjà bien occupés. Quand tout se passe bien, il n'est pas nécessaire d'intervenir: moins on intervient, mieux c'est. Et souvent, la chèvre se débrouille très bien toute seule !



POINT TECHNIQUE

LA MISE- BAS

Une chèvre qui va mettre bas a souvent le pie bien gonflé ! En effet, elle produit déjà du lait pour ses petits... La mise bas démarre lorsque la chèvre perd un espèce de filet jaune... Là, on commence à surveiller de près !

Quand tout se passe bien, la poche d'eau dans lequel baignent les chevreaux est rapidement percée, et le premier chevreau pointe le bout de son nez ainsi que les deux pattes avant. Si jamais la chèvre peine pour la suite, on peut tirer les deux pattes avant vers le bas pour la soulager. Le chevreau glisse tout seul. On dépose alors le chevreau près de sa mère pour qu'elle le sèche, elle le lèche.

Viennent ensuite les autres chevreaux s'il y en a !

La mise bas est terminée lorsque la chèvre "délivre": c'est à dire qu'elle expulse le placenta. Lorsque les bébés sont tous nés, elle se retrouve avec le placenta et tout le reste qui "sort" naturellement.

Dans les faits, ça pendouille sur les mamelles et ça finit par tomber intégralement. Certaines le mange, c'est plein de vitamines et tout et tout ... D'autres n'attendent même pas que la délivrance tombe ! Elle le tire comme celle-là ! <- Ahah

Il est très important de surveiller que la chèvre délivre. Si elle ne délivre pas, il y a un soucis !

Je suis donc aux Rondeaux pour le premier lot de mises bas qui a lieu mi février. Avec 400 chèvres, tout le monde ne met pas bas en même temps car l'éleveur créé 4 lots différents pour gérer ce pic de travail. Sur la première journée, environ 20 chèvres mettent bas. Souvent, ce sont des gestations multiples. On se retrouve donc avec environ le double de chevreaux !

Le programme est simple: lorsqu'il y a une naissance, il faut différencier la chevrette de renouvellement (à élever) et les mâles et les femelles qui partiront à l'engrais, pour faire du pâté, des saucisses et des merguez... (La boucherie quoi). Aux Rondeaux, ils gardent environ 100 chevrettes de renouvellement.

Premièrement, on regarde quelle chèvre a mis bas (on regarde le numéro de sa boucle) : si c'est une bonne laitière c'est à dire qu'elle produit beaucoup de lait, et qu'elle donne naissance à une femelle, on la "garde" ! Elle fera partie des **chevrettes de renouvellement du troupeau** ! Elles sont donc bichonnées : on leur coupe le cordon à environ 3 cm puis on le désinfecte.

Pour éviter la transmission de maladies: les chevrettes de renouvellement sont tout de suite emmenées dans la nurserie. Elles ne taitent pas sous la mère et ne sont pas léchées (le lait et la salive sont vecteurs de transmission). Il est rare qu'un troupeau soit indemne de maladies. Elles reçoivent donc à boire du **colostrum thermisé au biberon**. Le fait de chauffer le lait à une certaine température détruit l'ensemble des bactéries sans pour autant dénaturer les biens faits de ce colostrum.

Lorsqu'un chevreau naît, dans les quelques heures qui suivent, il doit boire environ 300 ml de colostrum. C'est VITAL ! Sans ça, il peut mourir dans les jours suivants. Parfois, il n'en boit que 200 ml... mais il doit absolument en avoir bu !

Il ne faut pas oublier de marquer les chevreaux avec un Tip-tag à chaque oreille. Le Tip-tag est une boucle de marquage qui n'est pas définitive: elle est plus petite et suffit pour des chevreaux que l'on emmène à l'abattoir. Il faut assurer le suivi sanitaire de tous les animaux. Les chèvres de renouvellement qui seront élevées auront ensuite deux boucles de marquage définitives.



LES PREMIERS JOURS DU CHEVREAU

Si le chevreau n'est pas une femelle à garder, le processus est bien plus naturel: une fois qu'il est né, la mère lèche son chevreau pour le sécher puis quand il n'est plus mouillé, il tente de se lever. Il peut alors têter le colostrum au pis de sa mère.

On les surveille ! On peut aussi traire le colostrum de la mère dans un biberon puis faire têter le biberon au chevreau. C'est plus simple pour s'assurer de la quantité ingérée par le petit.

Une fois qu'on est bien sûr que le colostrum soit bu, c'est départ pour la nurserie ! Ici les chevreaux restent entre 3 et 5 jours puis c'est direction ... "les Bahamas"... L'engraisneur vient les chercher. C'est l'heure du ramassage pour la boucherie.



Durant ma semaine, environ 150 chèvres ont mis bas. Tout s'est presque bien passé ... Une chèvre a avorté: elle a mis bas un chevreau mort. Le problème c'est que le chevreau se décompose très rapidement et si la chèvre le garde ne serait ce que 2 ou 3 jours "à l'intérieur", elle tombe malade. J'ai vu cette chèvre couchée toute la semaine, puis reprendre des forces petit à petit ! Le seul remède a été de l'antibiotique.

Évidemment, on a perdu les 2 chèvres malades et piquées car couchées depuis des semaines, juste après leurs mises bas.

Autre cas: une autre chèvre a mis bas 5 chevreaux ! Plus y'en a, plus ils sont petits et souvent les 5 ne sont donc pas viables. Elle a donné naissance à 3 petits chevreaux et les deux autres sont "morts en court de route". C'est Thierry qui a fouillé la chèvre pour les sortir...

Parfois, c'est le lendemain de la naissance ou les jours suivants que les chèvres faiblissent. Il est possible alors de leur donner un peu d'antibiotiques pour les rebooster.

On surveille les chèvres en permanence car c'est le moment le plus critique pour l'élevage: "il y a beaucoup de casse" comme dit Thierry, c'est pourquoi il est important de bien choisir les chèvres en amont que l'on met à la reproduction. J'en ai vu se remettre difficilement de la naissance, d'autres ne s'en remettre pas.

Idéalement, il faudrait **prévoir une maison de repos pour celles qui sont fatiguées** ... Ou trouver une famille d'accueil pour qu'elles deviennent de bonnes chèvres de compagnie !

Une fois que la chèvre a mis bas, on la traite tout de suite. Cela permet de stimuler la lactation. Attention, **on ne peut utiliser le lait pour fabriquer des fromages (ou pour l'envoyer à la laiterie) uniquement au bout de 7 jours**. Avant, le lait peut servir pour nourrir les chevreaux, sinon il est jeté ! Il faut donc trier les chèvres qui peuvent aller à la laiterie et les autres.

Je serai de retour aux Rondeaux dès la semaine prochaine pour assister au deuxième lot de mises bas. D'ici un mois, toutes les chèvres auront mis bas et le pic de lactation sera atteint quelques temps plus tard ! Je reviens très vite pour vous annoncer les suites de mon projet !